

[Painel do utilizador](#) / [As minhas disciplinas](#)

/ [Meios de Proteção em Agricultura biológica II - CTESP-AB](#) / [TESTES E QUESTÕES AULA](#)

/ [Teste curto 3 - 27.11.2019](#) / [Pré-visualização](#)

Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

Pergunta **1**

Por responder

Nota: 4,00

Refere qual é o equipamento mínimo de protecção recomendado durante a preparação da calda.



Pergunta **2**

Por responder

Nota: 3,00

Antes de preparar a calda há um conjunto de regras base que devem estar sempre presentes. Quais?



Pergunta **3**

Por responder

Nota: 3,00

Para cada um dos itens referidos, indica a que etapa da segurança no uso de pesticidas corresponde.

O material de aplicação está limpo, bem conservado e sem derramar. Existe um rolo de "teflon" para reparar algum tubo que verta.

Escolha...

No caso de existir excesso de calda, o operador sabe qual o procedimento a seguir.

Escolha...

Existe um inventário dos produtos existentes. É actualizado pelo menos de 3 em 3 meses.

Escolha...

O equipamento para aplicação da calda está limpo, bem conservado e sem derramar.

Escolha...

Existe a possibilidade de efectuar a tripla lavagem das embalagens

Escolha...

Existem sinais de proibição de fumar e de fazer lume.

Escolha...

Os produtos em pó ou granulados estão situados em prateleiras, por cima dos líquidos.

Escolha...

Existe, na proximidade, um recipiente com água limpa para lavagem das mãos e olhos em caso de contaminação accidental

Escolha...

São registadas todas as aplicações de produtos fitofarmacêuticos (localização, culturas, marca do produto e substancia(s) activa(s), quantidade aplicada e data da aplicação).

Escolha...

Pergunta **4**

Por responder

Nota: 4,00

No caso de ter que escolher de uma destas substâncias, que recomendação daria ao agricultor? Justifique.

Quadro 23. Valores de DL50 e CL50 para as s.a. em estudo

substância activa	Rat oral DL ₅₀ (mg/kg)	Rabbit dermal DL ₅₀ (mg/kg)	Bird acute oral DL ₅₀ (mg/kg)	Fish(CL ₅₀) (ppm)	Bee
mancozebe	> 5.000	> 5.000	>2000	10 – 100	> 2000
miclobutanil	1 600	>5.000(rat)	>2000	1 – 10	> 2000
difeconazol	1 453	2 010	>2000	0.1 – 1	> 2000
triticonazol	>2.000	>2.000	>2000	10 – 100	> 2000



*A*A▼

B

I

A▼



Pergunta **5**

Por responder

Nota: 2,00

Um herbicida pré-emergência é aplicado

Selecione uma opção:

- ☐ a. entre a sementeira e a emergência
- ☐ b. depois da emergência
- ☐ c. depois da colheita
- ☐ d. antes da sementeira

Pergunta **6**

Por responder

Nota: 2,00

Um inseticida de contacto ou estomacal é absorvidos quando o animal come os tecidos vegetais tratados com o pesticida ou seja a via de penetração é o sistema digestivo

Selecione uma opção:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso

Pergunta **7**

Por responder

Nota: 2,00

Apresenta um exemplo de um inseticida orgânico de origem mineral e um exemplo de um inseticida orgânico de origem vegetal

 A▼ B I A▼

