

Biologia do javali





Javali
Sus scrofa

Classificação Zoológica

Classe: Mammalia

Ordem: Artiodactila

Família: Suidae

Género: *Sus*

Espécie: *Sus scrofa*



Características Gerais

- É a espécie de caça maior com mais ampla representação no nosso país.
- Animal de dimensões grandes e aspecto robusto.
- Os membros são curtos e fortes mas o corpo é maciço.
- Pelagem bastante farta e rude, constituída por pêlos mais ou menos compridos - as cerdas.

Características Gerais

- A sua cor é cinzenta escura a negra nos adultos e, nos juvenis até aos 5-6 meses de idade, apresenta-se amarelada, com riscas horizontais no dorso, de tonalidade castanho-clara.



Características Gerais

PESO E DIMENSÕES:

- ▣ comprimento do corpo de 150 cm nos machos e 120-140 cm nas fêmeas;
- ▣ altura ao garrote de 95 cm nos machos e de 85 cm nas fêmeas;
- ▣ peso de 100Kg nos machos e de 80 Kg nas fêmeas.

Dimorfismo Sexual

- ❑ Machos têm maiores dimensões a sua cabeça é mais larga e menos afunilada
- ❑ Os com caninos são muito desenvolvidos (colmilhos), os quais com a idade se encurvam para cima e para trás.
- ❑ Estes dentes - navalhas (caninos inferiores) e amoladeiras (caninos superiores) - constituem o troféu do javali.

Habitat

- Utiliza habitats muito variados desde zonas agrícolas, matagais diversos, bosques e florestas de folha perene e caduca, carvalhais.
- Esta espécie necessita sobretudo de dois elementos: extensas zonas de abrigo - essencialmente constituídas por matos cerrados - e presença de água

Alimentação

- O javali apresenta uma dieta omnívora, constituída por frutos secos e carnudos, tubérculos, raízes, cereais, bolbos, tubérculos, partes aéreas de pequenas plantas invertebrados, pequenos mamíferos e ovos.
- Será no entanto de realçar uma preferência nítida por bolotas, castanhas e cereais, o que leva à ocorrência de incompatibilidade com a exploração agrícola, dado o risco de prejuízos de monta.

Reprodução

- Tanto os machos como as fêmeas atingem a maturidade sexual com 8 a 10 meses de idade.
- A época da reprodução tem lugar de Novembro a Janeiro.
- A gestação tem uma duração de 110 a 130 dias.
- As porcas prenhes afastam-se da vara para local isolado, onde parem em média duas a dez crias.
- Os nascimentos ocorrem de Fevereiro a Abril, tendo cada fêmea uma a duas ninhadas por ano.

Reprodução

- As crias - bácoros ou listados - são amarelas. raiadas de castanho escuro, mudando de pelagem aos seis meses, ficando com cor geral castanho-avermelhado.
- Dos seis meses ao ano chamam-se farropos, e a pelagem escurece progressivamente até apresentar um tom cinzenta-anegrado, chamando-se então javalis de vara.

Comportamento

- O javali apresenta uma actividade essencialmente crepuscular e nocturna.
- Durante a maior parte do ano verifica-se a existência de dois grupos sociais constituídos por fêmeas com crias e juvenis de ambos os sexos (varas) e, por machos adultos e sub-adultos.
- Verifica-se ainda com muita regularidade a presença de machos adultos solitários.
- Os machos adultos apenas se aproximam dos grupos de fêmeas e jovens na época da reprodução.